



## Rappaport-Vassiliadis-Salm.-Anr.bouillon (RVS) (RVS)

<b>Kürzel:</b> RVS
<b>Artikelnummer:</b> 60-1262
<b>Form:</b> Röhrchen, 9ml
<b>Farbe:</b> Türkis, transparent
<b>Lagerung:</b> Trocken, verschlossen, bei 15-22°C
<b>Haltbarkeit:</b> 2 Monate
<b>pH-Wert:</b> 5,2 ± 0,2 bei 25°C



### Zweckbestimmung und Anwendungsgebiet

Die RVS-Bouillon (Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP) dient der selektiven Anreicherung von Salmonellen. Das Medium erfüllt die Empfehlungen der harmonisierten Methode nach EP/USP/JP (2006).

### Typische Zusammensetzung

#### in g pro 1l Nährmedium

Sojapepton	4,5
Magnesiumchlorid, wasserfrei	13,58
Natriumchlorid	8
Dikaliumphosphat	0,4
Kaliumdihydrogenphosphat	0,6
Malachitgrün	0,036

## Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.

### Produktivität

Inkubationsbedingungen: 24 ± 3 Stunden bei 41,5 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: ≤ 100 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Salmonella enterica serovar Enteritidis + Escherichia coli + Pseudomonas aeruginosa	ATCC 13076 / WDCM 00030 + ATCC 8739 / WDCM 00012 + ATCC 27853 / WDCM 00025	> 10 Kolonien auf XLD-Agar	Kolonien mit schwarzem Zentrum und einer leicht transparenten rötlichen Zone infolge der Farbänderung des Mediums (XLD)

### Selektivität

Inkubationsbedingungen: 24 ± 3 Stunden bei 41,5 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: 10.000 - 1.000.000 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Escherichia coli	ATCC 8739 / WDCM 00012	< 100 Kolonien auf TSA	-
Enterococcus faecalis	ATCC 19433 / WDCM 00009	< 10 Kolonien auf TSA	-

### Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C

### Spezifikation

Ohne mikrobielle Kontamination